

Link do produktu: <https://artinus.eu/drontal-plus-flavour-35kg-2-tabletki-p-2095.html>



Drontal Plus flavour 35kg 2 tabletki

Cena **140,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Producent **BAYER**

Opis produktu

Bayer Drontal Plus Flavour tabletek na pasożyty 1 tabletki jest na 35kg masy ciała opakowanie zawiera 2 tabletki

Preparat przeciwpasożytniczy dla dużych psów, Powlekane tabletki na odrobaczanie.

Nie należy stosować u szceniąt poniżej 2 tygodnia życia.

Nie należy stosować u suk w pierwszych dwóch trymestrach ciąży.

Wskazania lecznicze Bayer Drontal tabletek na odrobaczanie

Tabletki przeznaczone do zwalczania inwazji nicieni i tasiemców przewodu pokarmowego psów, takich jak: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Taenia spp., Multiceps multiceps, Dipylidium caninum, Mesocostoides spp., Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis. Zwalczanie inwazji pierwotniaków Giardia spp.

Przeciwwskazania

Nie stosować u szceniąt poniżej 2 tygodnia życia

Nie stosować u suk w pierwszych dwóch trymestrach ciąży

Nie stosować łącznie z produktami zawierającymi lewamizol, morantel, piperazyne, a także dietylkarbamazol.

Preparat przeciwpasożytniczy dla psów, podaje się jednorazowo, można go ukryć w kawałku mięsa lub w psim smakołyku.

Można go dzielić, kruszyć, rozgniatać, mieszać z karmą.

Przed zastosowaniem u psów w złym stanie ogólnym lub psów z objawami silnego zarobaczenia, należy zwrócić się o poradę do weterynarza.

W celu zapobiegania możliwości ponownej inwazji pasożytów, wszystkie zwierzęta przebywające razem należy leczyć w tym samym czasie.

Po każdym zabiegu odrobaczania należy oczyścić otoczenie psa: legowisko, kocyk itp, a przede wszystkim usunąć pozostawione odchody.

Pchły są żywicielami pośrednimi jednego z powszechnie występujących tasiemców (Dypilidium caninum). Inwazja tasiemców będzie powracała jeśli nie zostanie przeprowadzone zwalczanie żywicieli pośrednich czyli pcheł.

Skład Bayer Drontal Plus Flavour 35kg

Jedna tabletki zawiera: febantelu 525mg, pyrantelu embonian 504mg, prazikwantel 175mg

Dawka lecznicza to: 15 mg febantelu, 14,4 mg embonianu pyrantelu i 5 mg prazikwantelu na 1 kg m.c., co odpowiada 1 tabletki na 35 kg m.c.

Przykład dawkowania:

17,5kg masy ciała - 1/2 tabletki

17,5kg-35kg masy ciała - 1 tabletki

35kg-52,5kg masy ciała - 1 1/2 tabletki



52,5kg-70kg masy ciała - 2 tabletki

Dawka lecznicza to : febantel 15mg, pyrantelu embonian 14,4mg, prazykwantel 5mg, na 1kg masy ciała, co odpowiada 1 tabletkie na 35kg masy ciała

Należy zachować 14 - dniowe odstępy między kolejnymi podaniami preparatu.

Przy zwalczaniu nicieni i tasiemców preparat Bayer Drontal podaje się jednorazowo.

W przypadku zakażenia glistami u szczeniąt po pierwszym podaniu preparatu pasożyty mogą nie zostać całkowicie wyeliminowane, należy wtedy ponownie podać preparat w 6, a potem 12 tygodniu życia.

Zwalczanie Giardia spp. - leczenie należy kontynuować przez 3 kolejne dni.

Preparat podaje się bezpośrednio do jamy ustnej psa lub po wymieszaniu z karmą.

Przy dłuższym stosowaniu wskazana jest konsultacja z lekarzem weterynarii, który może zalecić zmianę produktu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia oporności pasożytów

Uwaga: Bayer Drontal jest sprzedawany tylko z odbiorem osobistym w siedzibie firmy pod adresem ul. Wiśniowa 7 59706 Gromadka